


Trebam li raditi probir na rak vrata maternice iako sam primila cjepivo protiv HPV-a?

Da. Iako deveterovalentno cjepivo pokriva najčešće tipove HPV-a, među kojima i najrizičnije, HPV 16 i HPV 18, ono ne pokriva sve visokorizične tipove HPV-a. Stoga stručnjaci ipak preporučuju da nastavite s redovnim probirima na rak vrata maternice i nakon što ste primili cjepivo.

Važnost obavljanja godišnjeg sistematskog pregleda

Neke žene smatraju da ako ne trebaju raditi PAPA test ili test na HPV svake godine, mogu preskočiti godišnji sistematski pregled. Bez obzira na to što na godišnjem sistematskom pregledu možda nećete morati raditi PAPA test ili test na HPV, trebali biste posjetiti svog liječnika i obaviti klinički i ultrazvučni pregled te porazgovarali o drugim pitanjima koja se odnose na vaše zdravlje, kao što su:

- planiranje obitelji
- pregled dojki i mamografija
- savjetovanje o menopauzi i/ili sprečavanju osteoporoze
- prehrana i tjelovježba



Što je HPV test?

HPV test koristi se kod probira na rak vrata maternice kako bi se utvrdio rizik žene od pretkanceroznog stanja ili karcinoma. Test nudi tri rezultata u jednom testu: pojedinačne rezultate za HPV 16 i HPV 18, kao i skupni rezultat za 12 drugih tipova HPV-a visokog rizika. Dobivanje neposrednih informacija o riziku od raka vrata maternice vama i vašem liječniku može pomoći pri utvrđivanju daljnjih koraka.

Literatura

1. Leyden WA, et al, J Natl Cancer Inst. 2005;97(9):675-683.
2. Andrae B, et al, J Natl Cancer Inst. 2008;100(9):622-629.



www.hpv16and18.com



PROBIR NA RAK VRATA MATERNICE

Saznajte svoj rizik

Što je probir na rak?

Testovi probira mogu pomoći u identificiranju osoba kod kojih postoji rizik od razvijanja određenih vrsta raka. Za rak vrata maternice primarno postoje dvije vrste testova probira koje liječnici danas koriste, PAPA test i/ili test na HPV.

Što je PAPA test?


PAPA test traži abnormalne stanice koje rastu na vratu maternice, kojim želimo otkriti prekancerozne promjene ili rani stadij raka vrata maternice.

Ginekolog uzima obrisak stanica vrata maternice i uzorak šalje u laboratorij na pregled pod mikroskopom koji obavlja obučeni stručnjak - citolog.

Što je test na HPV?

Test na HPV otkriva DNK visokorizičnog humanog papiloma virusa (HPV) na razinama infekcije za koje se pokazalo da uzrokuju bolest vrata maternice visokog stupnja ili prekancerozno stanje.

Obrisak vrata maternice uzima se na isti način kao i za PAPA test. Uzorak se šalje u laboratorij kako bi se testirao na visokorizični HPV na automatiziranom instrumentu pomoću molekularne tehnologije.



Koja je razlika između PAPA testa i testa na HPV?

PAPA test traži promjene u stanicama prije nego što se razviju u rak. Test na HPV traži prisutnost HPV-ova visokog rizika za koje se zna da uzrokuju oko 99% svih slučajeva raka vrata maternice. Do 1/3 rakova vrata maternice se pojavljuje u žena s urednim rezultatima Papa testa, stoga se za bolju procjenu rizika raka vrata maternice preporučuje napraviti i test na HPV.

NORMALNI REZULTAT PAPA TESTA NIJE JAMSTVO DA OSOBA NIJE OBOLJELA OD RAKA. DO 1/3 RAKOVA VRATA MATERNICE POJAVLJUJE SE U ŽENA S UREDNIM REZULTATIMA PAPA TESTA.^{1,2}

Kako mogu znati koji je test probira najbolji za mene?

Sa svojim liječnikom možete se savjetovati koji je test probira na rak vrata maternice za vas najbolji. Medicinske smjernice nude različite načine na koje se testovi na HPV i PAPA testovi mogu koristiti ovisno o nizu faktora kao što su dob i povijest bolesti. Neki liječnici mogu odabrati kombiniranje PAPA testa i testa na HPV (što se naziva usporedno testiranje). Najnoviji znanstveni dokazi pokazuju da je korištenje testa na HPV kao jedinog testa primarnog probira sigurna, alternativna metoda probira. Obzirom da velik udio infekcija HPV-om prođe spontano bez posljedica, test na HPV kao primarna metoda probira se ne preporučuje djevojkama i ženama mlađim od 25 godina.

VAŽNOST PROBIRA NA RAK VRATA MATERNICE

- Rak vrata maternice je najčešće moguće spriječiti ako žene redovito dolaze na testove probira.
- Ako se dijagnosticira i liječi u ranoj fazi, rak vrata maternice ima visok postotak izlječenja.
- HPV je uzročnik gotovo svih rakova vrata maternice.

